



ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN MEDIANTE PULSO INTRAVENOSO (JERINGA PRECARGADA CON LA MEDICACIÓN)

Para su seguridad, es importante que administre correctamente su medicación mediante pulso intravenoso (Push IV) en casa. Llame al 1-800-755-4704 si tiene preguntas o inquietudes durante la administración del medicamento. Estamos disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana. En caso de emergencia, siempre llame al 911.

Para ver guías y videos educativos:

<https://chartwellpa.com/patients/patient-teaching-guides.asp>

INSUMOS:

- Jeringa con la medicación intravenosa
- (2) Jeringas precargadas con cloruro de sodio (solución salina)
- (1) Jeringa precargada con heparina (si se indica)
- Toallitas húmedas con alcohol o antiséptico

PROCEDIMIENTO DE ENJUAGUE SASH:

- S** Solución salina ___ ml
- A** Administrar el medicamento según las instrucciones del enfermero
- S** Solución salina ___ ml
- H** Heparina ___ ml (si es necesario)

PROCEDIMIENTO:

1. Limpie el área de trabajo. Lávese las manos exhaustivamente durante, al menos, 20 segundos. Reúna los insumos.
2. Prepare sus jeringas precargadas para enjuagar su catéter intravenoso según las instrucciones del enfermero.
3. Consulte las etiquetas del medicamento para ver el nombre, el fármaco, la frecuencia y el vencimiento. Inspeccione la jeringa de medicación en busca de fisuras, pérdida, material particulado y transparencia de la medicación. Comuníquese con Chartwell si hay discrepancias o inquietudes.
4. Conecte una jeringa precargada con cloruro de sodio/solución salina en la caperuza para introducción de agujas del catéter intravenoso según las instrucciones de su enfermero.
5. Desconecte la jeringa de la caperuza para introducción de agujas de su catéter intravenoso y deseche.
6. Limpie la caperuza para introducción de agujas en el extremo de su catéter intravenoso con una toallita con alcohol o antiséptico vigorosamente durante 30 segundos y deje secar al aire durante 60 segundos.



07-01-007

ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN MEDIANTE PULSO INTRAVENOSO (JERINGA PRECARGADA CON LA MEDICACIÓN)

7. Conecte la jeringa de medicación al extremo de su caperuza para introducción de agujas de su catéter intravenoso.
8. Administre la medicación de acuerdo con su Plan de tratamiento de Chartwell.
9. Desconecte la jeringa con medicación de la caperuza para introducción de agujas de su catéter intravenoso y deseche.
10. Limpie la caperuza para introducción de agujas en el extremo de su catéter intravenoso con una toallita con alcohol o antiséptico vigorosamente durante 30 segundos y deje secar al aire durante 60 segundos.
11. Conecte una jeringa precargada con cloruro de sodio/solución salina en la caperuza para introducción de agujas del catéter intravenoso según las instrucciones de su enfermero.
12. Desconecte la jeringa de la caperuza para introducción de agujas de su catéter intravenoso y deseche.

Si su catéter requiere el uso de heparina: complete los pasos 13 a 15; de lo contrario, omita.

13. Limpie la caperuza para introducción de agujas en el extremo de su catéter intravenoso con una toallita con alcohol o antiséptico vigorosamente durante 30 segundos y deje secar al aire durante 60 segundos.
14. Conecte una jeringa precargada con heparina en la caperuza para introducción de agujas del catéter intravenoso y enjuáguelo según las instrucciones de su enfermero.
15. Desconecte la jeringa de la caperuza para introducción de agujas de su catéter intravenoso y deseche.
16. Enjuague las luces adicionales según las instrucciones de su plan de tratamiento.
17. Lávese las manos exhaustivamente durante, al menos, 20 segundos.

****Todos los insumos y residuos pueden colocarse en bolsa doble y desecharse con su basura domiciliaria.****

NOTAS: