

سحب الدواء من قارورة (بالنسبة إلى التغذية الكاملة بالحقن أو المواد الإضافية للترطيب)

سحب الدواء بشكل سليم من قارورة بالمنزل مهم لسلامتكم. الرجاء الاتصال بـ 1-800-755-4704 إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات على الإطلاق بشأن تناول الدواء. متواجدون 24 ساعة، 7 أيام بالأسبوع. في حالة الطوارئ، اتصل دائماً برقم 911.

للأدلة التعليمية وفيديوهات الإرشاد:

<https://chartwellpa.com/patients/patient-teaching-guides.asp>

التجهيزات:

- حقنة مع إبرة مرفقة
- قارورة الدواء
- مسحات طبية/كحولية
- حاوية الأدوات الحادة

الإجراءات:

1. جمع التجهيزات. تنظيف منطقة العمل. غسل الأيدي بشكل كامل، لمدة 20 ثانية على الأقل.
2. التحقق من تسمية الدواء والمادة الفعالة وعدد مرات تناوله وصلاحيته. التحقق من قارورة الدواء في حالة الفتحاح والتسربات ومادة معينة وصفاء الدواء. تواصل مع Chartwell في حالة وجود أي تعارضات أو استفسارات.
3. أزل غطاء الحماية من القارورة وامسح أعلى القارورة بقوة لمدة 30 ثانية بمسحة طبية/كحولية.
4. أدخل الهواء ليساوي كمية الدواء التي يجب سحبها من القارورة إلى الحقنة من خلال سحبها نحو مكبس الحقنة.
5. أزل غطاء الإبرة بحرص من الحقنة. لا تلمس الإبرة.
6. أدخل الإبرة في وسط السدادة المطاطية بالقارورة.
7. اقلب القارورة وضخ الهواء من الحقنة إلى قارورة الدواء. اسحب مكبس الحقنة برفق، للسماح للدواء بملء الحقنة. اسحب الكمية المطلوبة من الدواء كما هو محدد على ملصق الوصفة الطبية.
8. اسحب الإبرة ببطء من القارورة، ثم استبدل غطاء الحماية بالإبرة بحرص باستخدام طريقة الجرف بيد واحدة حسب تعليمات الممرضة.